

ПРАЗІСТОП суспензія
(суспензія для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Суспензія жовтого кольору.

Склад

1,0 мл препарату містить діючі речовини:

празіквантел - 5,0 мг ± 10%

пірантелу памоат - 15,0 мг ± 10%.

Допоміжні речовини: натрію карбоксиметилцелюлоза, желатин, полісорбат, лимонна кислота, цукор, ароматизатор, 1,2-пропіленгліколь, вода очищена.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)

Препарат належить до комбінованих антигельмінтних препаратів. Комбінація празіквантелу та пірантелу памоат забезпечує широкий спектр антигельмінтної дії на всі фази розвитку круглих і стьожкових гельмінтів, що паразитують у собак і котів, в тому числі, *Toxocara canis*, *Toxocara mystax*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocestoides lineatus*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobothrium latum*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps*.

Механізм дії празіквантелу та пірантелу, що входять до складу препарату, ґрунтується на інгібуванні фумаратредуктази, стійкої деполяризації м'язових клітин гельмінтів, порушенні енергетичного обміну, що призводить до паралічу і загибелі гельмінтів і сприяє їх виведенню з травного каналу.

Пірантелу памоат діє як холінергічний антагоніст, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполяризуючої нервово-м'язової блокади.

Празіквантел швидко всмоктується зовнішньою оболонкою стьожкових гельмінтів, після чого настає її пошкодження та скорочення. Наслідком порушення проникаючої властивості мембран є параліч паразитів.

Застосування

Лікувально-профілактична дегельмінтизація собак і котів при нематодозах, цестодозах і змішаних нематодозно-цестодозних інвазіях: токсокароз (*Toxocara canis*, *Toxocara mystax*), токсаміоз (*Toxocaris leonina*), унцинаріоз (*Uncinaria stenocephala*), трихуроз (*Trichuris vulpis*), анкілостомоз (*Ancylostoma caninum*), ехінококоз (*Echinococcus granulosus*), альвеококоз (*Alveococcus multilocularis*), мезоцестоїдоз (*Mesocestoides Lineatus*), дипілідіоз (*Dipylidium caninum*), дифілоботріоз (*Diphyllobothrium latum*), теніїдоз (*Taenia spp.*).

Дозування

Перед застосуванням збовтати!

Препарат застосовують тваринам індивідуально одноразово під час

вранішнього годування з невеликою кількістю корму або вводять примусово на корінь язика за допомогою шприца-дозатора у дозі:

• котам (у т. ч. котенятам), собакам (у т. ч. цуценятам) - 1 мл суспензії на 1 кг маси тіла тварини.

Дотримання попередньої голодної дієти і застосування послаблюючих засобів не вимагається.

При сильній інвазії дегельмінтизацію рекомендують повторити через 10 діб.

Протипоказання

Не застосовувати препарат ослабленим та хворим на інфіційні захворювання тваринам!

Не застосовувати тваринам із відомою підвищеною чутливістю до складників препарату!

Не застосовувати цуценятам та кошенятам до 3 тижневого віку!

Не застосовувати самкам в першій половині вагітності!

Застереження

Дегельмінтизацію самок під час вагітності та лактації проводять за необхідності після консультації з лікарем ветеринарної медицини за 3 тижні до передбачуваних пологів і через 2-3 тижні після пологів.

Не застосовувати одночасно з піперазином і засобами, які інгібують холінестеразу.

Форма випуску

Полімерні флакони по 5 мл, укомплектовані шприцом-дозатором, упаковані в картонні коробки.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці за температури від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

61093, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 115, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

61105, м. Харків, вул. Зернова, 4, Україна