

МІКОСТОП

Листівка-вкладка

Опис

Розчин для зовнішнього застосування, рожевого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини: клотримазол – 1,0 г, саліцилову кислоту – 7,0 г. Допоміжні речовини: фармасепт, дистильована вода

Фармакологічні властивості

Клотримазол, що входить до складу препарату, має виражену фунгіцидну дію відносно збудників трихофітії та мікроспорії собак та котів (*Trichophyton rubrum*, *T. Mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*, *Malassezia furfur*), дріжджових грибів (роду *Candida*, *Rhodotorula*), грампозитивних (*Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Corynebacterium minutissimum*) та грамнегативних бактерій (*Bacteroides*).

Механізм дії полягає в зниженні синтезу ергостерину, який є складовою частиною клітинної мембрани мікробної стінки, що призводить до зміни її структури і властивостей та подальшої загибелі.

Саліцилова кислота посилює дію клотримазолу, діє протизапально та протиалергічно, запобігає утворенню набряків.

Препарат покращує трофіку, знижує відчуття болю та свербіжу шкіри.

Застосування

Лікування котів та собак при трихофітії, мікроспорії, бактеріальному дерматиті та ураженнях шкіри, викликаних дріжджовими грибами (роду *Candida*, *Rhodotorula*).

Дозування

Мікостоп у вигляді розчину: наносять на шкіру змоченим ватно-марлевим тампоном, з розрахунком 0,2-0,3 мл на 1 кг маси тварини, злегка втираючи в уражені місця від периферії до центру з захопленням меж здорової шкіри до 1 см.

Мікостоп у вигляді спрею: наносять на уражену ділянку шкіри, на відстані 10-15 см, рівномірно зволожуючи її, натиснюючи на розпилювальну головку протягом 1-2 секунд, з захопленням меж здорової шкіри до 1 см.

Обробки проводять 1-2 рази на добу до зникнення клінічних ознак захворювання, яке підтверджують мікроскопічними дослідженнями шкіри.

Протипоказання

Немає.

Застереження

Побічних явищ і ускладнень при застосуванні препарату згідно інструкції не спостерігається. При підвищенні індивідуальній чутливості тварини до компонентів лікарського засобу та появі ознак подразнення шкіри, обробку припиняють, препарат знімають тампоном і змивають водою.

Форма випуску

Полімерні флакони по 10 мл, полімерні флакони з механічними розпилуючими головками по 30 мл, упаковані в картонні коробки.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому темному місці, окрім від продуктів харчування та кормів, у недоступному для дітей і тварин місці, при температурі від 4 до 25 °C.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Дистрибутор:

ТОВ «НВП «Сузір'я»,
61093, Україна, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 115,
т./ф.: +38 (057) 786-73-80

Власник реєстраційного посвідчення

та виробник продукту:

ТОВ «НОВА ПЛЮС»,
вул. Колесніченківська, буд. 7, м. Харків, 61030, Україна,