

**ІНСЕКТОСТОП нашийник  
(нашийник)  
листівка–вкладка**

**Опис**

Стрічка поліхлорвінілова з фіксатором.

**Склад**

1,0 g (г) маси нашийника (стрічка поліхлорвінілова) містить діючу речовину: фіпроніл – 40,0 mg (мг).

Допоміжні речовини: стрічка поліхлорвінілова.

**Фармакологічні властивості**

**АТСvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX15, фіпроніл).**

Діюча речовина препарату, фіпроніл, уражає центральну нервову систему ектопаразитів, не впливаючи на центральну нервову систему ссавців. Механізм дії фіпронілу у безхребетних полягає в тому, що препарат гальмує проходження іонів хлору в ГАМК-залежних хлоридних каналах, порушуючи роботу нервової системи. Через системне блокування фіпронілом нервової системи настає нервове переїждження і загибель ектопаразита.

Фіпроніл має контактну дію і практично не всмоктується через шкіру. Він накопичується в епідермісі, жирових залозах, волосяних фолікулах і поступово вивільняється забезпечуючи тривалу контактну інсектоакарицидну дію. Створюється ефект "резервуару", що забезпечує тривалу залишкову активність фіпронілу.

Препарат є токсичним для риб і бджіл.

**Застосування**

Профілактика і лікування собак та котів при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides spp.*), вовшами (*Linognathus setosus*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), іксодовими кліщами (*Ixodes spp.*, *Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Haemaphysalis spp.*) на імагінальній, німфальній та личинковій стадіях розвитку.

**Дозування**

Нашийник виймають з упакування та одягають на шию тварини, нещільно фіксують таким чином, щоб між шиею та нашийником залишався проміжок до 2 см (см), потім закріплюють та обрізають надлишок.

Нашийник повинен вільно рухатися навколо шиї і не стримувати росту тварини. Постійне використання нашийника забезпечує захист тварин від ектопаразитів протягом 4 місяців.

Один нашийник розрахований для однієї тварини. Залежно від розміру тварин використовуються нашийники різної довжини:

- для котів, дрібних порід собак, цуценят і кошенят від 8 тижнів – нашийник довжиною  $35 \pm 5$  см (см);

- для середніх та великих порід собак – нашийник довжиною  $70 \pm 5$  см (см).

Рекомендовано періодично обробляти підстилки та засоби догляду за тваринами інсектоакарицидним спреєм ІНСЕКТОСТОП.

### **Протипоказання**

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам, а також тваринам чутливим до складників препарату!

Не застосовувати тваринам віком до 8 тижнів!

Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації!

### **Застереження**

У молодих тварин нашийник повинен бути вільним на шиї та не перешкоджати їх росту. При закріпленні нашийника на цуценятах та кошенятах необхідно залишати відрізок нашийника з урахуванням росту.

### **Форма випуску**

Нашийник запакований у фольговану плівку і вкладений у картонну коробку.

Для котів, дрібних порід собак, цуценят і кошенят нашийник довжиною  $35 \pm 5$  см (см), для середніх та великих порід собак нашийник довжиною  $70 \pm 5$  см (см).

### **Зберігання**

Зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окрім від продуктів харчування та кормів, за температури від 5 до 25 °C.

### **Термін придатності**

2 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

### **Власник реєстраційного посвідчення**

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.

### **Виробник готового продукту**

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.