

KIT BORKIT
фітокомплекс для корекції
порушень поведінки у котів та собак

1. Склад

Фітокомплекс рідких екстрактів рослин: кореневища з коренями валеріани (*Rhizomata cum radicibus valerianae*), трава меліси (*Herba Melissae*), листя м'яти перцевої (*Folia menthae*), трава материнки (*Herba Origani vulgaris*), трава пустирника (*Herba Leonuri*), листя кропиви (*Folia Urticae*), шишкі хмелю (*Strobili Lupuli*); олія льняна, натрій лимоннокислий, твін 80 (полісорбат), вода очищена.

1,0 мл кормової добавки містить:

Компоненти	Одиниці виміру	Кількість
Сирий протеїн, не менше	%	4,0
Сирий жир, не більше	%	0,5
Волога, не більше	%	53,0
Сума флавоноїдів, у перерахунку на рутин, не менше	%	0,004
Кислота валеріанова, не більше	%	0,04

2. Форма випуску

Емульсія.

3. Фармакологічні властивості

Кормова добавка забезпечує надходження до організму тварин рослинних мікронутрієнтів, які мають властивості, що сприяють корекції поведінки — послабленню почуття страху, зниженню агресивності.

Олія льняна містить в своєму складі поліненасичені жирні кислоти Омега-3, Омега-6, вітаміни А, Е, К, F, вітаміни групи В, калій, фосфор, магній, залізо, цинк, лецитин, бета-каротин, які сприяють покращенню фізіологічного стану тварини.

4. Клінічні особливості:

4.1 Вид тварини

Собаки, коти.

4.2 Показання до застосування

Застосовують для корекції поведінки у собак та котів, при надмірному збудженні, агресії, гіперактивності, нав'язливому вилизуванні, безпричинному постійному гавкоті або нявчанні, страху до гучних звуків, порушенні інстинкту помітки території, надмірному занепокоєнні за уявної вагітності, покращення обміну речовин, загального фізіологічного стану шкіри та шерсті.

4.3 Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів.

4.4 Особливі застереження при використанні

Не перевищувати рекомендованого дозування.

4.5 Застосування під час вагітності, лактації

Рекомендовано застосування згідно з дозуванням.

Перед застосуванням слід проконсультуватись з лікарем ветеринарної медицини.

4.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Немає.

4.7 Дози і способи введення тваринам різного віку

Кормову добавку застосовують перорально у дозі (на 1 тварину, мл): собаки – 4,0, коти – 2,0.

Застосовують 3-4 рази на добу впродовж 5-7 діб. Курс повторюють кожні 3-4 місяці.

4.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Слід дотримуватись рекомендованого дозування.

4.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Немає.

5. Фармацевтичні особливості:

5.1 Термін придатності

18 місяців.

5.2 Особливі заходи зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 до 25 °C.

5.3 Природа і склад контейнера первинного пакування

Полімерний флакон, об'ємом 20 мл, та мірний шприц, вкладені у картонні коробки по 1 штуці.

5.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним продуктом або із його залишками

Невикористаний продукт або його залишки утилізують згідно із чинними вимогами.

6. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна

7. Назва і місце знаходження виробника

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна

8. Додаткова інформація